

## Chirurgia korekcyjna

Leczyć w sposób nieprawidłowy oparzenia, skutki oparzeń są szczególnie drastyczne. W takich przypadkach jedyną szansą na poprawę stanu życia chorego są operacje chirurgiczne korekcyjne.

Leczenie tradycyjnymi klasycznymi metodami powoduje często zmniejszenia kończyn. W przypadku szczególnie dzieci ale też dorosłych postępująca degradacja tkanek nawet przy stosunkowo niegroźnych oparzeniach drugiego stopnia, sięga ścięgna a to doprowadza do zmniejszenia kończyn. Powstają przykurcze palców lub całych dłońi lub stóp. Obecnie lekarze w zasadzie mają to w planie leczenia - traktują to jako koszt leczenia uważając, że to nieuniknione. Dopiero w drugim etapie próbują to naprawiać chirurgiami korekcyjnymi kosmetycznymi. To dodatkowe cierpienie dla osób poparzonych - dodatkowe często wielokrotne operacje i przeszczepy skóry.

Poniżej chirurgiczna korekcja stopy poparzonej kilkuletniej dziewczynki. Operacja wykonana poprawnie w miarę najlepiej jak byś można.

Poniżej stan po zaleczeniu ran pooperacyjnych i po usunięciu szwów.